

# GIBB A3

(Kwas giberelinowy/Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL

Telefon: +40756871258

Fax: +40318105910

<http://www.giberelina.ro>

[office@giberelina.ro](mailto:office@giberelina.ro)



## GIBERELINA GA3 = STYMULATOR / REGULATOR WZROSTU / FITOHORMONY (Do uprawy pszenicy, jęczmienia i ziemniaków)

**GIBERELINY.** Stymulują naturalny wzrost i rozwój roślin, mając często spektakularne efekty, które zyskały uwagę specjalistów w ostatnim dziesięcioleciu ponieważ osiągnięto znakomite wyniki w produkcji rolnej, ogrodnictwie, leśnictwie i hodowli roślin leczniczych.

Główne zmiany zachodzące w metabolizmie roślin dzięki giberelinom to:




- zwiększone wydzielanie wody i zwiększone zużycie wody;
- intensyfikacja fotosyntezy;
- stymulowanie oddychania podczas kiełkowania nasion;
- opóźnienie starzenia się tkanek roślinnych;
- korygowanie negatywnych skutków wirusów i Botrytis;
- niska zawartość skrobi u roślin i nasion kiełkujących.



Gibereliny zostały odkryte i stosowane od ponad 100 lat na całym świecie w celu stymulowania wzrostu roślin.

Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju dla Gleboznawstwa, Agrochemii i Środowiska - ICPA w Bukareszcie potwierdziły wzrost wydajności wywołany przez stosowanie kwasu giberelinowego GA3, substancji znanej jako Giberelina GA3.

Wzrost między 19 do 38% zaobserwowano przy testowaniu na uprawach nawożonych.



**- GIBB A3 jest złożony, zamiast ciemności i w Max. 32 ° C!**

Produkt autoryzowany przez:

- Ministerstwa Rolnictwa,
- Ministerstwa Środowiska,
- Ministerstwa Zdrowia

Importer / Dystrybutor autoryzowany:

SC RomSoft SRL / Romania

Nr: 621/29.04.2014

# GIBB A3

(Kwas giberelinowy/Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL

Telefon: +40756871258

Fax: +40318105910

<http://www.giberelina.ro>

[office@giberelina.ro](mailto:office@giberelina.ro)



---

## **OGÓLNE INSTRUKCJE DOT STOSOWANIA WYROBU GIBB A3**

- Rozpuścić **3** tabletki (dla **pszenicy** i **jęczmienia**) lub **10** tabletek (do **ziemniaki**) GIBB A3 5gx20% w 100 l wody, a następnie dodać 400 l wody. Uzyskujecie roztwor 500 L. Czas rozpuszczania co najmniej 8 minut.
- Należy podawać przez rozpylanie, na liściach, 2-3 krotnie, w postaci roztworu w ilości 500 l / ha na każde stosowanie.
- Zaleca się stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, w celu uniknięcia degradacji. Produkt jest słabym kwasem organicznym i ulega zmianom w alkalicznych wodach. Z tego samego powodu, nie należy mieszać z innymi substancjami.
- Zaleca się stosowanie w chłodnej pogodzie (rano lub wieczorem), nie w pełnym słońcu.
- Jeśli w ciągu 8 godzin od aplikacji pada mocno, działanie produktu może być ograniczone. W tym przypadku zaleca się ponowne zastosowanie o stężeniu 50% w stosunku do początkowego stosowania.
- **Nie mieszać** produktu z innymi pestycydami lub innymi nawozami dolistnymi, aby uniknąć degradacji / przemiany substancji czynnej.

## **SPECYFICZNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA WYROBU GIBB A3**

### • Dla PSZENICY i JĘCZMIENIA, 2 (dwóch) zabiegi:

- faza I, na początku powstawania słomy
- faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu

### • Do ZIEMNIAKÓW, 3 (trzy) zabiegi:

- faza I, 10-15 dni po wydstać się z pierwszych liści
- faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu
- faza III, na początku powstawania bulw

**Stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Danych Bezpieczeństwa!**