

GIBB A3

(Kwas giberelinowy/Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL

Telefon: +40756871258

Fax: +40318105910

<http://www.giberelina.ro>

office@giberelina.ro



GIBERELINA GA3 = STYMULATOR / REGULATOR WZROSTU / FITOHORMONY

GIBERELINY. Stymulują naturalny wzrost i rozwój roślin, mając często spektakularne efekty, które zyskały uwagę specjalistów w ostatnim dziesięcioleciu ponieważ osiągnięto znakomite wyniki w produkcji rolnej, ogrodnictwie, leśnictwie i hodowli roślin leczniczych.

Główne zmiany zachodzące w metabolizmie roślin dzięki giberelinom to:






- zwiększone wydzielanie wody i zwiększone zużycie wody;
- intensyfikacja fotosyntezy;
- stymulowanie oddychania podczas kiełkowania nasion;
- opóźnienie starzenia się tkanek roślinnych;
- korygowanie negatywnych skutków wirusów i Botrytis;
- niska zawartość skrobi u roślin i nasion kiełkujących.



Gibereliny zostały odkryte i stosowane od ponad 100 lat na całym świecie w celu stymulowania wzrostu roślin.

Badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Badań i Rozwoju dla Gleboznawstwa, Agrochemii i Środowiska - ICPA w Bukareszcie potwierdziły wzrost wydajności wywołany przez stosowanie kwasu giberelinowego GA3, substancji znanej jako Giberelina GA3.

Wzrost między 16 do 19% zaobserwowano przy testowaniu na uprawach nie nawożonych.



- GIBB A3 jest złożony, zamiast ciemności i w Max. 32 ° C!

Produkt autoryzowany przez:

- Ministerstwa Rolnictwa,
- Ministerstwa Środowiska,
- Ministerstwa Zdrowia

Importer / Dystrybutor autoryzowany:
SC RomSoft SRL / Romania
Nr: 621/29.04.2014

GIBB A3

(Kwas giberelinowy/Giberelina GA3)

SC RomSoft SRL

Telefon: +40756871258

Fax: +40318105910

<http://www.giberelina.ro>

office@giberelina.ro



OGÓLNE INSTRUKCJE DOT STOSOWANIA WYROBU GIBB A3

- Rozpuścić 3 tabletki GIBB A3 5gx20% w 100 l wody, a następnie dodać 400 l wody. Uzyskujecie roztwór 500 L. Czas rozpuszczania co najmniej 8 minut.
- Należy podawać przez rozpylanie, na liściach, 2-3 krotnie, w postaci roztworu w ilości 500 l / ha na każde stosowanie.
- Zaleca się stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, w celu uniknięcia degradacji. Produkt jest słabym kwasem organicznym i ulega zmianom w alkalicznych wodach. Z tego samego powodu, nie należy mieszać z innymi substancjami.
- Zaleca się stosowanie w chłodnej pogodzie (rano lub wieczorem), nie w pełnym słońcu.
- Jeśli w ciągu 8 godzin od aplikacji pada mocno, działanie produktu może być ograniczone. W tym przypadku zaleca się ponowne zastosowanie o stężeniu 50% w stosunku do początkowego stosowania.
- **Nie mieszać** produktu z innymi pestycydami lub innymi nawozami dolistnymi, aby uniknąć degradacji / przemiany substancji czynnej.

SPECYFICZNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA WYROBU GIBB A3

Dla SŁONECZNIKA zastosować dwa (2) zabiegi:

- faza I, przy powstaniu 3 - 4 liści;
- faza II, przy powstaniu 10 - 12 liści.

Dla POMIDORÓW zastosować trzy (3) zabiegi:

- fazy I po posadzeniu, przed kwitnieniem;
- faza II po kwitnieniu;
- faza III na początku wiązania kwiatów.

Dla WINOROŚLI zastosować trzy (3) zabiegi:

- Faza I, przed kwitnieniem;
- Faza II po kwitnieniu;
- Faza III na początku formowania gron

Stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Danych Bezpieczeństwa!