



Zabiegi stymulatorem wzrostu GIBERELINA GA3

POMIDORY ORAZ WINOROŚL, Zwiększa produkcję o 16-20%/ha

Rozpuszcza się **3 tabletki / 200 L wody / ha**; Stosuje się **trzy** zabiegi dolistne:

Stosowanie dla POMIDORÓW:

- faza I, po plantacji, przed zakwitnięciem;
- faza II, po zakwitnięciu;
- faza III, na początku zawiązywania owoców.

Stosowanie dla WINOROŚLI:

- faza I, przed zakwitnięciem;
- faza II, po zakwitnięciu;
- faza III, na początku formowania się kiści.

KARTOFLI, Zwiększa produkcję o >30%/ha

Rozpuszcza się **10 tabletek / 200 L wody / ha**; Stosuje się **trzy** zabiegi dolistne:

- faza I, po 10-15 dniach od kiełkowania;
- faza II, przed zakwitnięciem lub 2-3 tygodnie od pierwszego zabiegu;
- faza III, na początku tworzenia bulw.

PSZENICY, Zwiększa produkcję o 5-8%/ha

Rozpuszcza się **3 tabletki / 200 L wody / ha**; Stosuje się **dwa** zabiegi dolistne:

- faza I, na początku powstawania słomy
- faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu

RYŻ i JECZMIENIA, Zwiększa produkcję o 15-20%/ha

Rozpuszcza się **3 tabletki / 200 L wody / ha**; Stosuje się **dwa** zabiegi dolistne:

- faza I, na początku powstawania słomy
- faza II, 2-3 tygodnie po pierwszym zabiegu

SŁONECZNIKA, Zwiększa produkcję o 15-20%/ha

Rozpuszcza się **3 tabletki / 200 L wody / ha**; Stosuje się **dwa** zabiegi dolistne:

- faza I, przy powstaniu 3 - 4 liści;
- faza II, przy powstaniu 10 - 12 liści.

LUCERNY, Zwiększa produkcję suchej masy o 20%/ha

Rozpuszcza się **10 tabletek / 200 L wody / ha**; Stosuje się **jeden** zabieg dolistny:

- Zabieg można zastosować w dowolnym momencie wzrostu lucerny.

SŁODKIE CZEREŚNIE: **10 tabletek/ 1.000 L**, zastosowanie dolistne na 2 tygodnie przed zbiorami;
Powstają twardsze, cięższe owoce, ładny wygląd, o większej odporności na składowanie, opóźnia powstanie plam

TRUSKAWKI: **14 tabletek / 200 L / ha**, pierwsze zastosowanie **20 dni** przed zakwitnięciem; można zastosować jeszcze dwa zabiegi po zakwitnięciu, przy zachowaniu 15 dni odstępu pomiędzy nimi. *Zwiększa liczbę, wielkość i jakość owoców.*

PAPRYKA/ OSTRA PAPRYCZKA: **10 tabletek / 200 L / ha**, stosuje się zabieg w okresie tworzenia kwiatów. *Zwiększa liczbę owoców, ich wielkość i jakość, włącznie ze wzrostem suchej masy.*

CUKINIA/ SAŁATA/ SZPINAK: **9 tabletek/ 300 L/ ha**, stosuje się pojedynczy zabieg na 4 – 5 tygodni przed zniwami. *Stymuluje wzrost, zwiększa odporność na zimno.*

Zabiegi stosuje się maksymalnie 24 godziny od przyrządzenia roztworu, aplikuje się je o chłodnej porze, rano lub wieczorem, gdy prawdopodobieństwo deszczu w następujących 4 godzinach jest minimalne. W przypadku deszczu po zabiegu, należy powtórzyć zabieg przy użyciu 1/2 dawki pierwotnej.

Stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Karcie Danych Bezpieczeństwa!

Produkt autoryzowany przez: - Ministerstwa Rolnictwa; - Ministerstwa Środowiska; - Ministerstwa Zdrowia
Autoryzowany: Nr: 621/29.04.2014